

## INFORMATION PREOPERATOIRE

### ALVULSIONS DENTAIRES MULTIPLES

Étiquette patient

Cachet du Médecin

Les avulsions dentaires multiples sont indiquées :

- ✓ lorsque les dents constituent un risque infectieux et ne peuvent bénéficier de traitements conservateurs (en prévision d'un traitement médical immunosuppresseur, d'une chimiothérapie ou d'une radiothérapie cervico-faciale, ou par rapport à certaines pathologies médicales), ceci afin de prévenir les risques de complications infectieuses.
- ✓ en vue d'une réhabilitation prothétique globale.

#### PRINCIPE DE L'INTERVENTION

L'intervention peut s'effectuer sous anesthésie locale ou sous anesthésie générale, en fonction du caractère invasif de l'acte et/ou du statut médical du patient (pathologie médicale, coopération, état psychologique...)

#### SUITES HABITUELLES

Les suites opératoires normales sont : l'œdème (gonflement des joues), la douleur, la limitation de l'ouverture de la bouche, ainsi qu'un petit saignement de quelques heures. Une gêne esthétique est possible ainsi que fonctionnelle (phonation et mastication).

#### RISQUES ET COMPLICATIONS

Tout acte chirurgical, même bien mené, comporte des risques de complications, qui doivent cependant être relativisés au regard des bénéfices attendus :

- ✓ Hématome et saignement persistant,
- ✓ Alvéolite : inflammation ou infection de l'alvéole dentaire,
- ✓ Cellulite : inflammation ou infection des tissus mous de la face ou de la bouche,
- ✓ Lésion d'une dent voisine, descellement d'une couronne, fracture d'une restauration d'un bridge ou d'une dent.
- ✓ Communication entre la bouche et le sinus qui se ferme seule le plus souvent (4 à 8 semaines). En cas de persistance, une intervention sera nécessaire pour obtenir sa fermeture.

En cas de complications, il est conseillé de prendre contact avec votre chirurgien.

**Dans le cadre de la consultation, il vous a été exposé, pour votre cas précis, les risques et les effets secondaires de cet acte.**