

## INFORMATION PREOPERATOIRE

### CHIRURGIE IMPLANTAIRE

Étiquette patient

Cachet du Médecin

Les implants sont des « racines artificielles » en alliage de titane. Mis en place dans les maxillaires, ils supportent des prothèses dentaires fixes ou amovibles destinées à remplacer des dents absentes. Le nombre et la position des implants dépendent donc du projet de prothèse, défini préalablement.

#### PRINCIPE DE L'INTERVENTION

L'intervention s'effectue le plus souvent sous anesthésie locale. L'anesthésie générale n'est indiquée qu'en cas d'implants multiples, de gestes chirurgicaux associés, et/ou du statut médical du patient (pathologie médicale, coopération, état psychologique, ...)

#### SUITES HABITUELLES

Les suites opératoires normales peuvent être : l'œdème (gonflement des joues), la douleur, un petit saignement.

#### RISQUES ET COMPLICATIONS

Tout acte chirurgical, même bien mené, comporte des risques de complications immédiates ou tardives, qui doivent cependant être relativisées au regard des bénéfices attendus :

- ✓ Lésion d'une dent voisine
- ✓ Hématome et saignement persistant,
- ✓ Cellulite : inflammation ou infection des tissus mous de la face ou de la bouche,
- ✓ Sinusite maxillaire,
- ✓ Perte ou diminution de la sensibilité de la lèvre ou de la langue, le plus souvent transitoire (quelques semaines à quelques mois), et exceptionnellement définitive.
- ✓ Péri-implantite, mobilité, exposition de l'implant,
- ✓ Perte de l'implant.

En cas de complications, il est conseillé de prendre contact avec votre chirurgien.

*Cette information concerne uniquement la phase de pose des implants et pas de la réalisation prothétique.*

*Des contrôles cliniques et radiographiques doivent être effectués par le praticien en charge de la prothèse.*

*La pose d'implants dentaires est un acte qui n'est pas inscrit à la nomenclature de la sécurité sociale.*

**Dans le cadre de la consultation, il vous a été exposé, pour votre cas précis, les risques et les effets secondaires de cet acte.**