

INFORMATIONS MEDICALES

SOINS BUCCODENTAIRES EN CAS DE PRISE D'ANTIRESORPTIFS OSSEUX

Étiquette patient

Cachet du Médecin

- ✓ Vous allez recevoir un traitement par antirésorptif osseux

Ou

- ✓ Vous êtes traité par antirésorptifs osseux et devez bénéficier d'une intervention chirurgicale orale (par ex. une avulsion dentaire)

Ou

- ✓ Vous avez été exposé à ce type de traitement

Il est important dans ce contexte que vous ayez connaissance des recommandations afin de réduire le risque de survenue d'une nécrose de l'os de la mâchoire (**ONM**).

► **Le risque de survenue d'une ONM** est faible mais ne doit pas être sous-estimé. Toutefois, il peut être augmenté selon l'indication, le type et la durée du médicament prescrit mais aussi par un état bucco-dentaire altéré. Certains problèmes médicaux ou la prise de médicament(s) associé(s) peuvent accentuer le risque de survenue d'ONM.

► **Pour réduire ce risque, une consultation odontologique est recommandée avant de débiter le traitement par antirésorptifs osseux** (médicaments prescrits dans le cadre du traitement de l'ostéoporose ou de pathologies cancéreuses).

► **Pendant le traitement par antirésorptifs osseux**, Il vous faut préserver un bon état bucco-dentaire. Le maintien à vie de cette hygiène bucco-dentaire rigoureuse est indispensable.

Le risque de survenue d'une ONM est quasiment inexistant pour la plupart des soins dentaires courants : détartrage, soins de caries, dévitalisation, réalisation de couronnes ou de prothèses dentaires. Il peut être toutefois augmenté par une chirurgie orale. C'est pourquoi, votre praticien respectera un protocole adapté pour minimiser ce risque. Après l'acte chirurgical, un suivi est indispensable afin de vérifier la cicatrisation de la zone opérée.

► **La surveillance bucco-dentaire** est annuelle ou semestrielle selon l'avis du praticien. La nécessité d'un suivi à long terme est liée au fait que le risque de survenue d'une ONM persiste longtemps même après l'arrêt d'un traitement par bisphosphonate.

► **Vous devez contacter votre Chirurgien-Dentiste ou votre Médecin en présence des signes suivants** : dent mobile, inflammation, saignement gingival, mauvaise odeur dans la bouche, impression d'épine osseuse.

Dans le cadre de la consultation, il vous a été exposé, les risques et les effets secondaires inhérents à l'acte opératoire en relation avec votre traitement.